

Pharysol TOS pediátrico

- ✓ Calma la tos seca y productiva
- ✓ Ayuda a eliminar mucosidades
- ✓ Protege las mucosas

1. Identificación, composición e indicaciones del producto sanitario

El producto sanitario **Pharysol Tos Pediátrico** es capaz de calmar la tos, aliviar la sensación de ardor y ayudar a la expectoración del exceso de secreciones gracias a su complejo exclusivo de polisacáridos presentes en los extractos de plantas y en el **complejo Pedimucil**.

Pharysol Tos Pediátrico calma la tos seca y productiva y también es un coadyuvante útil para proteger las vías respiratorias, ya que crea una barrera mucoadhesiva capaz de limitar el contacto con los irritantes y los patógenos.

1.1 Mecanismo de acción

Son muy frecuentes el dolor de garganta, la tos y otras enfermedades agudas del tracto faríngeo y traqueobronquial, causadas a menudo por patógenos o por la exposición a irritantes de estímulos nocivos, como los contaminantes medioambientales y las temperaturas rigurosas.

Pharysol Tos Pediátrico está formulado con extractos de plantas para proteger la mucosa, aliviar la tos y ayudar a la expectoración. Los polisacáridos contenidos en los extractos de plantas y en el **complejo Pedimucil** forman un gel mucoadhesivo que ejerce una acción protectora y una barrera capaz de limitar el contacto con los agentes externos y los irritantes. Gracias a su afinidad por el agua, los polisacáridos promueven la hidratación de las membranas mucosas y reducen la mucosidad. Además, los extractos calmantes alivian la tos seca y productiva. El producto contiene miel, lo que le proporciona un agradable sabor.

1.2 Ingredientes

Complejo Pedimucil (extracto de musgo de Islandia 0,5%, arabinogalactano 1,1%), jarabe de fructosa, miel, concentrado de zumo de manzana, extracto de llantén (0,3%), extracto de altea (0,7%), aroma de naranja, aceite esencial de naranja dulce y caramelo.

Sin gluten. Sin lactosa.

2. Envase

Botella de 175 ml.

3. Posología y vía de administración

Niños de 1 a 6 años: Medio vaso dosificador (5 ml.), hasta un máximo de 2 veces al día.

Niños de más de 6 años: Medio vaso dosificador (5 ml.), de 2 a 4 veces al día.

Agitar bien antes de usar. Cerrar herméticamente después del uso.

Se aconseja tomar el producto con prescripción médica.

4. Efectos secundarios

Nunca se han notificado efectos secundarios con las dosis necesarias para lograr un efecto terapéutico. Las únicas contraindicaciones conocidas son las producidas en casos individuales de alergia/hipersensibilidad a las sustancias. No usar en caso de alergia conocida a las abejas.

La única excepción podría ser, en casos raros, hinchazón leve y transitoria debido a la fermentación intestinal de polisacáridos.

5. Interacciones con suplementos dietéticos y medicamentos

No se conocen interacciones de los componentes del **Pharysol Tos Pediátrico** con suplementos dietéticos y medicamentos a las dosis usadas en el producto. No obstante, como norma general se recomienda tomar el producto 2 horas antes o después de la ingestión de medicamentos o complementos dietéticos. Consulte a su médico en caso de estar recibiendo otros tratamientos farmacológicos. La única interacción conocida es una modificación de la farmacocinética del ibuprofeno por el arabinogalactano de alerce.

6. Conservación

Conservar **Pharysol Tos Pediátrico** en un lugar seco y alejado de fuentes directas de calor o luz. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto entre 8 °C y 25 °C. Cerrar bien después del uso.

7. Advertencias y precauciones

En niños menores de 3 años, use el producto solo bajo prescripción médica. No lo use si tiene obstrucciones esofágicas. En caso de hernia de hiato, consulte a su médico antes de comenzar a tomar el producto. Una vez abierto, usar antes de 2 meses. Mantener fuera del alcance de los niños. No tomar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes: contiene miel, llantén, grindelia, musgo de Islandia y arabinogalactano de alerce.

La tos y el dolor de garganta pueden ser síntomas de infección: consulte a su médico si los síntomas persisten después de 10-12 días de tratamiento o si aparece fiebre.

No utilizar **Pharysol Tos Pediátrico** durante más de 30 días, si los síntomas persisten consulte a su médico. No exceda la dosis recomendada.

Este producto contiene glucosa y fructosa. Debe tenerse en cuenta para los pacientes que controlan su consumo de azúcar.

8. Fecha de caducidad

No tomar después de la fecha de caducidad impresa en el envase. La fecha de caducidad se refiere al producto en su envase almacenado sin abrir.

9. Eliminación

El producto caducado debe eliminarse conforme a las normas establecidas por el organismo local. En ningún caso deseche el producto o su envase en el medio ambiente.

Producto sanitario CE0476. Última versión: Diciembre 2019.

¿Su opinión es importante para nosotros!

Tómese 5 minutos para completar la encuesta en el siguiente enlace www.siiit-pms.com/pharysol-tos-pediatico o escanee el código QR, esto nos ayudará a evaluar su nivel de satisfacción sobre el producto.



Fabricante:
SIIT srl - Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul
Naviglio (MI) - ITALY



Distribuido en España por:
Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6ª
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA
www.reva-health.com

